



# Tanke

**20 SC**

## Descripción del producto:

TANQUE® 20 SC es un insecticida de amplio espectro que actúa por contacto e ingestión en el control de larvas. También ha demostrado acción traslaminar y sistémica, principalmente cuando se utiliza en tratamientos al suelo.

Es muy persistente, tanto en el follaje como en el suelo, lo que proporciona un tiempo prolongado de efectivo control de las plagas.

Composición: 200 gramos de Fipronil por litro de producto comercial.

### Modo de acción:

TANQUE® 20 SC interfiere con el paso de los iones de cloruro a través del canal regulado por el ácido gamma amino butírico, (GABA), afecta el sistema nervioso central y finalmente ocasiona la muerte de los insectos.

## Presentaciones:

100 mL; 250 mL; 1 L

## Cultivos donde se utiliza:

Chile, Algodón, caña de azúcar, tabaco, cítricos, Mango, Papa, Arroz, hortalizas.

## Indicaciones generales:

### COMPATIBILIDAD:

Es compatible con la mayoría de plaguicidas en el mercado, sin embargo es recomendable hacer pequeñas muestras cuando se utilicen otros productos en la mezcla.

Es incompatible con productos de reacción alcalina,

### FITOTOXICIDAD:

No es fitotóxico a la dosis y cultivos recomendados.

## Instrucciones de manejo:

### FORMA DE PREPARACION DE LA MEZCLA:

Llene el tanque de aplicación hasta la mitad de su volumen de agua. Agregar la dosis recomendada del producto poniendo el sistema de agitación o re-circulación a funcionar y termine de llenar con agua el volumen del tanque de aplicación.

El caldo de aplicación debe usarse el mismo día que se prepara la mezcla.

Plagas	Dosis	I.A.C*	I.R**
Picudo del chile ( <i>Anthonomus eugenii</i> ) Afido del algodón ( <i>Aphis gossypii</i> ) comején o termita ( <i>Heterotermes sp</i> ) Trips ( <i>Thrips sp</i> ) Tecia solanivora ( <i>Scrobipalopsis solanivora</i> ) Palomilla de la papa ( <i>Phthorimaea operculella</i> ) Mosca minadora del arroz ( <i>Hydrellia sp</i> ) Chinchas ( <i>Oebalus sp</i> ) Palomilla dorso de diamante o Gusano del repollo ( <i>Plutella xylostella</i> ) Gallina ciega ( <i>Phyllophaga sp</i> ) Gusano alambre ( <i>Agriotes sp</i> )	189 mL/ha      125 ml/mz	15 días	24 horas después de la aplicación. Si es necesario ingresar antes debe usar equipo de protección personal.

\*Intervalo entre la última aplicación y cosecha \*\*Intervalo de réingreso

### Principales plagas que controla



Picudo del chile ( *Anthonomus eugenii* )



Afido del algodón ( *Aphis gossypii* )



comején o termita ( *Heterotermes sp* )



Gusano alambre ( *Agriotes sp* )

